

GASTROSKOPIA –INFORMACJA DLA PACJENTA

CO TO JEST GASTROSKOPIA ?

Badanie gastroscopowe jest endoskopowym badaniem które pozwala na dokładną ocenę przełyku, żołądka i początkowego odcinka dwunastnicy. Badanie wykonywane jest giętkim aparatem grubości 8 mm wyposażonym w kamerę. W trakcie badania pobierany jest drobny wycinek celem oznaczenia ewentualnej infekcji bakterią *Helicobacter pylori*

Gastroskopię wykonuje się:

- w celu diagnostyki bóli brzucha,
- w celu diagnostyki anemii
- przy diagnostyce wymiotów
- przy niewyjaśnionym spadku masy ciała
- przy objawach krwawienia (smoliste stolce, krwiste lub fusowate wymioty)
- przy zaburzeniach połykania
- przy objawach refluksu żołądkowo-przełykowego (zgaga, bóle w nadbrzuszu i zamostkowe)
- jako badanie profilaktyczne przy rodzinnym występowaniu raka żołądka

JAKIE PRZYGOTOWANIE JEST WYMAGANE PRZED BADANIEM?

Do badania gastroscopowego należy zgłosić się po 7 godzinach powstrzymania się od spożywania pokarmów i płynów. Większość leków może być zażywana jak dotychczas. Zaleca się (o ile to możliwe) odstawienie na 7 dni przed badaniem leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w żołądku. W dniu badania nie należy żuć gumy oraz palić papierosów. Jednakże należy poinformować lekarza o zażywanych lekach szczególnie jeżeli są to leki wpływające na układ krzepnięcia (Acenocumarol, Warfin, Syncumar, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Brilique, Polocard, Acard, Plavix

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PODCZAS GASTROSKOPII?

Zwykle badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, chociaż część pacjentów odczuwa podczas badania duży dyskomfort związany z uczuciem ciała obcego w gardle. Często podczas badania występuje odruch wymiotny. Może się również pojawić uczucie rozpierania w nadbrzuszu . Zwykle nie odczuwa się dolegliwości bólowych.

CZY BADANIE JEST WYKONYWANE W ZNIECZULENIU?

Każde badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym gardła Xylokainą. Na życzenie pacjenta badanie może być wykonane w analgesedacji, która polega na dożylnym podaniu leków uspokajająco-nasennych oraz p/bólowych. Leki te eliminują lek i stres oraz dyskomfort związany z badaniem oraz ewentualne dolegliwości bólowe. Po podaniu sedacji pacjent słabiej reaguje na bodźce, ma ograniczoną sprawność psychofizyczną, możliwy jest krótkotrwały płytki sen. Objawy związane z analgesedacją ustępują po ok 4 godzinach po badaniu, jednak w dniu badania nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

CO W PRZYPADKU JEŻELI GASTROSKOPIA WYKAŻE PATOLOGIE?

Jeżeli lekarz podczas badania zauważy podejrzaną zmianę może wykonać biopsję celem zdiagnozowania patologii. Preparaty przesyła do badania histopatologicznego. Jeżeli w trakcie badania lekarz uwidoczni polipy, zazwyczaj ich usunięcie wymaga hospitalizacji. Polipy usuwa się używając kleszczy biopsyjnych lub specjalnej pętli. W przypadku innych zmian zazwyczaj jest możliwe postawienie rozpoznania od razu oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

CO DZIEJE SIĘ PO GASTROSKOPII ?

Po badaniu możesz odczuwać nieznaczne wzdęcie spowodowane przez powietrze wprowadzone do żołądka podczas badania. Uczucie to mija po odbiciu powietrza. Zazwyczaj przez około godziny występuje uczucie zdrętwienia gardła (efekt znieczulenia miejscowego) Po badaniu możesz odżywiać się i powrócić do normalnej aktywności życiowej tego samego dnia. Jeśli badanie było wykonane w analgosedacji nie wolno prowadzić samochodu lub innych urządzeń w dniu badania gdyż leki podane w czasie znieczulenia mogą upośledzać Twoją sprawność psychofizyczną. Z tego powodu do badania proszę zgłosić się z pełnoletnią osobą towarzyszącą, która odwiedzi Cię do domu po badaniu.

JAKIE SĄ POWIKŁANIA BADANIA ?

Gastroskopia jest badaniem bezpiecznym w rękach doświadczonego endoskopisty. Komplikacje są bardzo rzadkie jednakże mogą wystąpić. Należą do nich krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii (prawdopodobieństwo do 5%) oraz perforacja przełyku (prawdopodobieństwo bliskie zeru, zazwyczaj uwarunkowana chorobą przełyku np. uchyłek lub przy usuwaniu ciała obcego). Perforacja może wymagać zabiegu operacyjnego do zaopatrzenia miejsca perforacji.

Bardzo rzadko występują też objawy uboczne po podaniu leków uspokajających (nadmierna senność, zasłabnięcie, zatrzymanie oddechu). Opisano pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca podczas badania. Również w miejscu wkłucia do żyły może powstać bolesne zgrubienie lub krwiak.

WAŻNE!!!

Jeśli przyjmujesz leki obniżające krzepnięcie krwi koniecznie poinformuj o tym fakcie w trakcie rejestracji na badanie. Być może konieczne będzie czasowe odstawienie tych leków, aby możliwe było pobranie wycinków w czasie badania.

Powiedz o tym również lekarzowi przed wykonaniem badania!