

PRZYGOTOWANIE DO REKTOSKOPII I ANOSKOPII ORAZ ZABIEGÓW PROKTOLOGICZNYCH

Przygotowanie rozpoczyna się w dniu, w którym planowane jest badanie.

Należy wcześniej zaopatrzyć się w 2 szt. preparatu REKTANAL lub ENEMA (dostępny w aptece bezrecepty). Preparat ten służy do wykonania lewatywy. Na 6 godzin przed badaniem należy wykonać lewatywę przy użyciu preparatu Rektanal lub Enema wg załączonej do preparatu ulotki.

Zabieg powtórzyć na 2 godziny przed badaniem

Jeśli badanie zaplanowano w godzinach popołudniowych można rano zjeść niewielkie śniadanie. W pozostałych przypadkach do badania należy zgłosić się na czczo.

Należy zażywać stale przyjmowane leki.

UWAGA !

1. Chorzy na cukrzycę powinni w tym dniu odstawić insulinę i leki doustne i monitorować poziom glukozy glukometrem co 3 godziny !
2. Chorzy przyjmujący doustne antykoagulanty (Acenokumarol, Syncumar, Sintrom, Warfin, Pradaxa, Plavix itp.) powinni poinformować o tym lekarza przed wykonaniem badania – w przypadku planowanego zabiegu proktologicznego należy powiadomić o tym lekarza co najmniej na 7 przed planowanym terminem zabiegu.

Jeśli masz pytania - zadzwoń. Telefon do rejestracji 14 6240043